


Dermodrin

diphenhydramine



Dermodrin Ointment/ Дермодрин маз

Количествен и качествен състав: 1g маз съдържа - 20 mg активно вещество Diphenhydramine hydrochloride. **Лекарствена форма:** Охлаждаща антихистаминова маз за приложение върху кожата. Основа: емулсия масло във вода. **Показания:** Лечение на сърбеж, локални болки и реакции на свръхчувствителност на кожата при: дерматити, уртикария, сърбеж, екзема, сърбящи ръбове на рани и лющени; ухапвания от насекоми; леки изгаряния, слънчево изгаряне; полиморфна фотодерматоза (слънчева алергия). **Противопоказания:** Свръхчувствителност към дифенхидраминхидрохлорид, към други антихистаминови средства или към някоя от помощните съставки на продукта. *Новородени и деца под 2 години.* Дермодрин маз не трябва да се нанася върху отворени рани или лигавици, освен това не трябва да се използва при кожни изменения с голяма повърхност, като възпалена и наранена кожа особено при пациенти с варицела, морбили и мехури по кожата. **Бременност и кърмене:** Дермодрин маз не трябва да се използва в първия триместър на бременността. По време на останалия период от бременността употребата върху големи повърхности трябва да се избягва, особено върху възпалена и наранена кожа. Дермодрин маз не трябва да се употребява по време на кърмене, тъй като активното вещество (дифенхидрамин) преминава в кърмата. **Производител и притежател на разрешението за употреба:** Pharm. Fabrik Montavit Ges.m.b.H., 6060 Absam/Tyrol, Austria.

Отпуска се без рецепта.



Представителство за България, 1164 София,
Montavit тел.: 02/866 33 58, 963 11 81, e-mail: montavit@montavitbg.com

Dermodrin

diphenhydramine

*Антихистаминова маз с анестетичен ефект
за лечение на сърбеж, локална болка и
реакции на свръхчувствителност на кожата*

**2 пъти
по-силно
действие**



Montavit



Профил на продукта

- Антихистаминов ефект = конкурентна, обратима блокада на H1 рецепторите в тъканите

Хистамин, образуван в мастоцитите + кератоцитите

Съдов ендотел

Вазодилатация

Повишава съдовата пропускливост

Оток

Зачервяване

Свободни нервни краища в дермо – епидермалната граница

Сърбеж

Усещане за болка



- Локален анестетичен ефект
 - механизъм – потискане на кожните рецептори за чувствителност
 - Дифенхидрамин – свързан структурно с лидокаина
- В проспективно двойно сляпо рандомизирано проучване
 - Дифенхидрамин 1% предизвиква анестезия
 - по-голям ефект от плацебо ($p > 0,001$); еквивалентен на лидокаин 1%
- Охлаждащ ефект – маслено/водна емулсия
- Кремов препарат на основата на недразнеща маз – може лесно да се втрие в кожата + ефективната съставка се разпределя равномерно
- Дълъг опит на пазара
- Безопасен и добре толериран

- Лечение на сърбеж, локална болка и реакции на свръхчувствителност на кожата при:
 - алергии,
 - ухапвания от насекоми,
 - дерматити,
 - уртикария,
 - пруритус,
 - екземи,
 - сърбящи краища на рани и екскориаии,
 - малки изгаряния, слънчеви изгаряния,
 - полиморфни фотодерматози.

- Дозирание:

Според големината на третираното място се нанася количество с големината на череша до орех от Дермодрин маз (съответстващи на 1-3g) върху засегнатото място на кожата.

Възрастни: нанасят 4-6 пъти дневно. *Деца:* само 4-5 пъти дневно.

Възрастни и деца: не се препоръчва надвишаване на дневната доза от 15g Дермодрин маз

Продължителността на употреба зависи от тежестта и размера на засегнатата област. При по-продължителна употреба се препоръчва преоценка на лечението.

