


Тавипес

ДИШАЙ ЕСТЕСТВЕНО И СВОБОДНО

МАСЛО ОТ ЦВЯТ
НА ЛАВАНДУЛА



Състав:

1 капсула съдържа 150 mg масло от широколистна лавандула (Lavandula latifolia Medik)

Показания:

Растителен лекарствен продукт, муколитик.
Използва се като експекторант и като спомагателно средство към антибиотичното лечение в случай при:
- Остър и хроничен бронхит
- Бронхиектазии
- Синузит
- Кашлица при пушачи

Противопоказания:

Свръхчувствителност към лавандулово масло

Дозировка:

Възрастни и деца над 12 години, по 2 капсули 3 пъти дневно

Начин на приложение:

Тавипек капсули се погълщат цели с малко течност, 30 минути преди хранене

Опаковка:

30 броя стомашно-устойчиви меки капсули

Отпуска се без лекарско предписание.

A0075/26.04.2018г.

Производител:

Pharm. Fabrik Montavit Ges.m.b.H
6067 Absam/Tirol,
Австрия



Представителство за България:

1407 София, кв. Хладилника, ул. „Сребърна“ 2, сграда Б, ет. 9;
тел.: 02/866 33 58; office@montavit.bg; www.montavit.bg;
<https://www.facebook.com/Montavitbg/>



ПРИ ОСТРИ И ХРОНИЧНИ СИНУЗИТИ ,
БРОНХИТИ И КАШЛИЦА.



ТАВИПЕК ПРИ ОСТЬР РИНОСИНУЗИТ

МНОГОЦЕНТРОВО , РАНДОМИЗИРАНО,
ПЛАЦЕБО - КОНТРОЛИРАНО КЛИНИЧНО ИЗПИТВАНЕ

- Цел: Да оцени ефикасността и безопасността на Tavipec при възрастни с вирусен ОРС.
- 288 пациенти с остьр риносинузит (147 пациента приемат Tavipec ® 3 пъти по 2 капсули от 150 mg на ден; 141 приемат плацебо в същата схема).

При оценката се използва сбор от резултатите (скор)

MSS - Major Symptom Score


- Назална обструкция
- Ринорея
- Постназално стичане
- Синусно главоболие
- Лицева болка

Всеки критерий се оценява по 5 степенна скала (от 0 – липсващ до 4 – тежък).


Quality of Life

- Оценява се промяната на скора след 4 и 7 дни на лечение в сравнение с началното

Резултати по MSS и QoL



Резултати по MSS компоненти



Резултати :

7 дневното лечение с Tavipec ® при пациенти с ОРС води до значимо подобреие на:

MSS и QoL.

Дозовия режим се понася добре, не са установени нови странични ефекти

* Dejaco D, Bocian-Sobkowska J, Szymanski W, et al. Tavipec in acute rhinosinusitis: a multi-centre, doubleblind, randomized, placebo-controlled, clinical trial. *Rhinology* 2019; 57:367-374.

Двойно - сляпо, рандомизирано, плацебо – контролирано, мултицентрово, мултинационално проучване за оценката на ефикасност и безопасност на Tavipec ® капсули при остьр бронхит

- Цел: изследване ефекта на прием Tavipec ® 3 пъти по 2 капсули дневно за 10 дни при пациенти с остьр бронхит сравнен с прием на плацебо.
- 245 пациенти с остьр бронхит (125 пациента приемат Tavipec; 120 приемат плацебо).
- Оценка на ефекта по Bronchitis Severity Score и QoL в началото на проучването, 7-ми и 10-ти ден от началото на приема.

Bronchitis Severity Score (BSS):


Сбор от оценяване на:

- Кашлица
- Експекторация
- Хрипове
- Гръден болка по време на кашлица
- Диспнея

Оценката се прави въз основана попълнен от пациента въпросник и преглед от доктор.


Всеки критерии се оценява по 5-степенна скала (от 0 - липсващ до 4 - много тежък)

- Оценка на 7-ми ден:
- Понижение на BSS с 4,54 при Tavipec ® групата в сравнение с 2,92 при плацебо групата.




- Бързо повлияване на кашлицата и сигнификантна разлика в сравнение с плацебо на 7-ми и 10-ти ден при прием на Tavipec ®

- Приемът на Tavipec ® разко и сигнификантно редуцира диспнеята в сравнение с плацебо.



Приемът на Tavipec ® подобрява качеството на живот на пациентите в сравнение с плацебо при отчитане на 7-ми и 10-ти ден.



*Kahler C, Derezinski T, Bocian-Sobkowska J, et al. Spicae aetheroleum in uncomplicated acute bronchitis: a double-blind, randomised clinical trial. *Wien Med Wochenschr* 2019; 169:137-148