

Състав: 1 g URONT® уретрална емулсия съдържа 0,4 mg дексаметазон и 20 mg лидокаин хидрохлорид. Помощни вещества: 0,5 mg хлорхексидинов дихидрохлорид и 0,5 mg метилпарахидроксибензоат.

Показания: Профилактика на стриктури на уретрата, образувани след инструментални трансуретрални интервенции.

Дозировка: URONT® емулсия трябва да се прилага от лекар. Индивидуалната доза се определя от лекар с опит. Ако лекарят не е предписал друго, обичайната употреба е по 1-3 туби URONT® емулсия всеки ден в продължение на 10 дни, след това по 1 туба URONT® емулсия през ден в продължение на 20 дни. Лечението продължава с по 1 туба всяка седмица до максимум 4 месеца.

Съдържанието на една туба е достатъчно да напълни уретрата. Не трябва да се инстилират повече от една туба наведнъж. Глюкокортикоидите трябва да се прилагат само за такава продължителност от време и само в такива ниски дози, каквито са необходими за постигане и поддържане на желаните терапевтични ефекти.

Деца и юноши до 18 години: URONT® емулсия не трябва да се прилага при деца и юноши до 18 години. При възрастни или отслабнали пациенти, както и при пациенти с тежки чернодробни или бъбречни нарушения дозата трябва внимателно да се адаптира към клиничната картина на пациента.

Начин на приложение:

1. Почистете и дезинфекцирайте външния отвор на уретрата.
2. Отстранете хартията от прозрачната горна повърхност до стеснението на блистера.
3. Отчупете връха на апликатора, ако е възможно докато е още в блистера.
4. Инстилирайте емулсията бавно, с леко и постоянно натискане на тубата.

Противопоказания: Свръхчувствителност към активните вещества или към някое от помощните вещества; Деца и юноши до 18 години; Първият триместър на бременността; Церебрална малария; Свръхчувствителност към други локални анестетици от амиден тип; Тежка сърдечна недостатъчност, изразена брадикардия, AV-блок, кардиогенен или хиповолемичен шок; Специфични процеси в областта на приложение (сифилис, туберкулоза). В случай на първична бактериална или микотична инфекция URONT® емулсия се прилага само след като инфекцията се овладее. При пациенти с възпалена или наранена уретрална лигавица абсорбцията на URONT® емулсия може да се повиши и да доведе до предозиране.

Лекарствени взаимодействия: URONT® емулсия не трябва да се прилага интрауретрално едновременно с други лекарства, съдържащи лидокаин хидрохлорид или други локални анестетици от амиден тип.

Бременност и кърмене: Прилагането на URONT® емулсия е противопоказано през първия триместър на бременността. През втория и третия триместър от бременността да се прилага след преценка на съотношението полза/риск и след внимателно определяне на индивидуалната доза. По време на кърмене нуждата от URONT® емулсия трябва да бъде строго установена от лекар и индивидуалната доза дефинирана. При нужда от по-високи дози кърменето трябва да се преустанови. Повторно прилагане по време на бременност и кърмене не се препоръчва.

Нежелани реакции: Нежеланите реакции са много редки, ако URONT® емулсия се прилага според препоръките за дозиране и употреба и с необходимото внимание.

Лекарствена форма: Бяла емулсия за интрауретрална инстиляция. URONT® емулсия е поставен в полипропиленови туби тип „хармоника“ за еднократна употреба. Всяка партида от URONT® емулсия е тествана за микробиологична чистота.

Производител: Pharmazeutische Fabrik Montavit Ges.m.b.H, 6067 Absam/Tirol, Austria.



Montavit

Представителство за България: 1164 София, тел.: 02/866 33 58, 963 11 81, e-mail: office@montavit.bg



URONT® Емулсия

dexamethasone & lidocaine hydrochloride

Профилактика на стриктури* на уретрата, образувани след инструментални трансуретрални интервенции



- Превенция/редукция на стриктурите
- Ефективност, доказана от активните вещества самостоятелно или в комбинация
 - Лидокаин + Дексаметазон
 - Премахва болката + Лечение + Профилактика на инфекции
- Специално предназначена туба за еднократна употреба
 - Туба тип „хармоника“ с апликаторен накрайник и отчупващ се връх
- Маслено – водна емулсия
 - Инстиляция без опасност от последващ рефлукс
 - Компонентите на емулсията – толерантни към лигавица и открити рани


*Предотвратяване на стесняването на уретрата и минимизиране на лезиите

Умната удобна комбинация от две активни съставки

URONT® емулсия




Uront® емулсия успешно намалява риска от развитие на стриктури и подобрява индивидуалните симптоми¹



*Развитието на стриктури е свързано с увреждане на уретралната лигавица, така че процентът от пациентите с всякакви уретрални симптоми също бяха оценени в края на терапията.

Индивидуалните симптоми се подобриха значително между 67% - 84%.

Подобрение спрямо началото на терапия с URONT® емулсия



Апликаторен конус

- Гладък, атравматичен, без остри ръбове
- Анатомичен дизайн – лесен за инстилация

Апликаторен връх

- Отстранява се
- Лесен за отчупване
- Отчупва се вътре в конуса

Туба тип „хармоника“

- Мека и бавна инстилация
- Без опасност от блокиране на буталото

12,5g емулсия

1. Panosch B, Gelehr J, Schiechl J, Mayr O. Post Marketing Surveillance Study on Uromont Emulsion 2008 Feb.-Dec.